

FOLHETO INFORMATIVO / ROTULAGEM

*Este rótulo contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar
ECTODINE, solução cutânea com precaução para obter os devidos efeitos.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.*

ECTODINE, Solução cutânea

USO EXTERNO

Solução anti-séptica, bactericida e fungicida

Frasco de 5 ml

COMPOSIÇÃO: Iodopovidona 100 mg/ml.

Excipientes: Tensioactivo aniónico, ácido cítrico (E-330), fosfato disódico e água purificada.

FORMA FARMACÊUTICA: solução cutânea.

CLASSIFICAÇÃO ATC: D08AG02

CATEGORIA FÁRMACO-TERAPÊUTICA:

Grupo XIV-1: Anti-infecciosos de aplicação tópica na pele

XIV-1-e: Anti-sépticos

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS, POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:

Dermatites microbianas (furúnculos e antrazes, foliculites, piodermites e acne papulopustuloso) e micóticas (pé de atleta, intertigo genital, prurido anal e vulvar).

Desinfecção da pele, das mucosas (antes de intervenções cirúrgicas, injecções e punções), e de feridas

Modo de usar: Aplicar localmente **ECTODINE, solução cutânea** pura, tantas vezes quanto necessário.

Desinfecção de queimaduras do 1º, 2º e 3º graus.

Modo de usar: Utilizar **ECTODINE, solução cutânea** sem diluição no penso de queimaduras ou diluída a 1/4 na lavagem das mesmas.

Lavagens do couro cabeludo

Modo de usar: Deitar cerca de 30 gotas de **ECTODINE, solução cutânea** em 1/2 litro de água.

Lavagens peritoneais

Modo de usar: Utilizar **ECTODINE, solução cutânea** diluída a 1/10 em soro fisiológico.

CONTRA-INDICAÇÕES: *ECTODINE, solução cutânea* não deve ser utilizada em indivíduos com hipersensibilidade ao iodo, durante a gravidez e em recém-nascidos com menos de 30 dias.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: A aplicação repetida de *ECTODINE, solução cutânea* em grandes superfícies cutâneas ou em zonas com pele lesada, pode provocar uma excessiva absorção de iodo.

INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS: Não utilizar ao mesmo tempo que *ECTODINE, solução cutânea* outros produtos contendo sais mercuriais.

Comunique ao seu Médico ou Farmacêutico qualquer efeito adverso observado com a utilização deste produto.

Conservar a temperatura inferior a 25°C e ao abrigo da luz.

Verifique o prazo de validade inscrito na embalagem.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Medicamento não sujeito a receita médica.

FABRICADO E COMERCIALIZADO POR:

PARACÉLSIA – Indústria Farmacêutica, SA

Rua Antero de Quental, 639

4200-068 Porto

NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (INFARMED):

3404095 – *ECTODINE, solução cutânea* frasco de 5 ml.

DATA DA REVISÃO DO TEXTO:

12 de Agosto de 2005.

FOLHETO INFORMATIVO / ROTULAGEM

*Este rótulo contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar
ECTODINE, solução cutânea com precaução para obter os devidos efeitos.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.*

ECTODINE, Solução cutânea

USO EXTERNO

Solução anti-séptica, bactericida e fungicida

Frasco de 10 ml

COMPOSIÇÃO: Iodopovidona 100 mg/ml.

Excipientes: Tensioactivo aniónico, ácido cítrico (E-330), fosfato disódico e água purificada.

FORMA FARMACÊUTICA: solução cutânea.

CLASSIFICAÇÃO ATC: D08AG02

CATEGORIA FÁRMACO-TERAPÊUTICA:

Grupo XIV-1: Anti-infecciosos de aplicação tópica na pele

XIV-1-e: Anti-sépticos

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS, POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:

Dermatites microbianas (furúnculos e antrazes, foliculites, piodermites e acne papulopustuloso) e micóticas (pé de atleta, intertigo genital, prurido anal e vulvar).

Desinfecção da pele, das mucosas (antes de intervenções cirúrgicas, injecções e punções), e de feridas

Modo de usar: Aplicar localmente **ECTODINE, solução cutânea** pura, tantas vezes quanto necessário.

Desinfecção de queimaduras do 1º, 2º e 3º graus.

Modo de usar: Utilizar **ECTODINE, solução cutânea** sem diluição no penso de queimaduras ou diluída a 1/4 na lavagem das mesmas.

Lavagens do couro cabeludo

Modo de usar: Deitar cerca de 30 gotas de **ECTODINE, solução cutânea** em 1/2 litro de água.

Lavagens peritoneais

Modo de usar: Utilizar **ECTODINE, solução cutânea** diluída a 1/10 em soro fisiológico.

CONTRA-INDICAÇÕES: *ECTODINE, solução cutânea* não deve ser utilizada em indivíduos com hipersensibilidade ao iodo, durante a gravidez e em recém-nascidos com menos de 30 dias.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: A aplicação repetida de *ECTODINE, solução cutânea* em grandes superfícies cutâneas ou em zonas com pele lesada, pode provocar uma excessiva absorção de iodo.

INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS: Não utilizar ao mesmo tempo que *ECTODINE, solução cutânea* outros produtos contendo sais mercuriais.

Comunique ao seu Médico ou Farmacêutico qualquer efeito adverso observado com a utilização deste produto.

Conservar a temperatura inferior a 25°C e ao abrigo da luz.

Verifique o prazo de validade inscrito na embalagem.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Medicamento não sujeito a receita médica.

FABRICADO E COMERCIALIZADO POR:

PARACÉLSIA – Indústria Farmacêutica, SA

Rua Antero de Quental, 639

4200-068 Porto

NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (INFARMED):

3407194 – *ECTODINE, solução cutânea* frasco de 10 ml.

DATA DA REVISÃO DO TEXTO:

12 de Agosto de 2005.

FOLHETO INFORMATIVO / ROTULAGEM

*Este rótulo contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar
ECTODINE, solução cutânea com precaução para obter os devidos efeitos.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.*

ECTODINE, Solução cutânea

USO EXTERNO

Solução anti-séptica, bactericida e fungicida

Frasco de 50 ml

COMPOSIÇÃO: Iodopovidona 100 mg/ml.

Excipientes: Tensioactivo aniónico, ácido cítrico (E-330), fosfato disódico e água purificada.

FORMA FARMACÊUTICA: solução cutânea.

CLASSIFICAÇÃO ATC: D08AG02

CATEGORIA FÁRMACO-TERAPÊUTICA:

Grupo XIV-1: Anti-infecciosos de aplicação tópica na pele

XIV-1-e: Anti-sépticos

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS, POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:

Dermatites microbianas (furúnculos e antrazes, foliculites, piodermites e acne papulopustuloso) e micóticas (pé de atleta, intertigo genital, prurido anal e vulvar).

Desinfecção da pele, das mucosas (antes de intervenções cirúrgicas, injeções e punções), e de feridas

Modo de usar: Aplicar localmente **ECTODINE, solução cutânea** pura, tantas vezes quanto necessário.

Desinfecção de queimaduras do 1º, 2º e 3º graus.

Modo de usar: Utilizar **ECTODINE, solução cutânea** sem diluição no penso de queimaduras ou diluída a 1/4 na lavagem das mesmas.

Lavagens do couro cabeludo

Modo de usar: Deitar cerca de 30 gotas de **ECTODINE, solução cutânea** em 1/2 litro de água.

Lavagens peritoneais

Modo de usar: Utilizar **ECTODINE, solução cutânea** diluída a 1/10 em soro fisiológico.

CONTRA-INDICAÇÕES: *ECTODINE, solução cutânea* não deve ser utilizada em indivíduos com hipersensibilidade ao iodo, durante a gravidez e em recém-nascidos com menos de 30 dias.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: A aplicação repetida de *ECTODINE, solução cutânea* em grandes superfícies cutâneas ou em zonas com pele lesada, pode provocar uma excessiva absorção de iodo.

INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS: Não utilizar ao mesmo tempo que *ECTODINE, solução cutânea* outros produtos contendo sais mercuriais.

Comunique ao seu Médico ou Farmacêutico qualquer efeito adverso observado com a utilização deste produto.

Conservar a temperatura inferior a 25°C e ao abrigo da luz.

Verifique o prazo de validade inscrito na embalagem.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Medicamento não sujeito a receita médica.

FABRICADO E COMERCIALIZADO POR:

PARACÉLSIA – Indústria Farmacêutica, SA

Rua Antero de Quental, 639

4200-068 Porto

NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (INFARMED):

3407293 – *ECTODINE, solução cutânea* frasco de 50 ml.

DATA DA REVISÃO DO TEXTO:

12 de Agosto de 2005.

FOLHETO INFORMATIVO / ROTULAGEM

*Este rótulo contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar
ECTODINE, solução cutânea com precaução para obter os devidos efeitos.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.*

ECTODINE, Solução cutânea

USO EXTERNO

Solução anti-séptica, bactericida e fungicida

Frasco de 125 ml

COMPOSIÇÃO: Iodopovidona 100 mg/ml.

Excipientes: Tensioactivo aniónico, ácido cítrico (E-330), fosfato disódico e água purificada.

FORMA FARMACÊUTICA: solução cutânea.

CLASSIFICAÇÃO ATC: D08AG02

CATEGORIA FÁRMACO-TERAPÊUTICA:

Grupo XIV-1: Anti-infecciosos de aplicação tópica na pele

XIV-1-e: Anti-sépticos

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS, POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:

Dermatites microbianas (furúnculos e antrazes, foliculites, piodermites e acne papulopustuloso) e micóticas (pé de atleta, intertigo genital, prurido anal e vulvar).

Desinfecção da pele, das mucosas (antes de intervenções cirúrgicas, injeções e punções), e de feridas

Modo de usar: Aplicar localmente **ECTODINE, solução cutânea** pura, tantas vezes quanto necessário.

Desinfecção de queimaduras do 1º, 2º e 3º graus.

Modo de usar: Utilizar **ECTODINE, solução cutânea** sem diluição no penso de queimaduras ou diluída a 1/4 na lavagem das mesmas.

Lavagens do couro cabeludo

Modo de usar: Deitar cerca de 30 gotas de **ECTODINE, solução cutânea** em 1/2 litro de água.

Lavagens peritoneais

Modo de usar: Utilizar **ECTODINE, solução cutânea** diluída a 1/10 em soro fisiológico.

CONTRA-INDICAÇÕES: *ECTODINE, solução cutânea* não deve ser utilizada em indivíduos com hipersensibilidade ao iodo, durante a gravidez e em recém-nascidos com menos de 30 dias.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: A aplicação repetida de *ECTODINE, solução cutânea* em grandes superfícies cutâneas ou em zonas com pele lesada, pode provocar uma excessiva absorção de iodo.

INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS: Não utilizar ao mesmo tempo que *ECTODINE, solução cutânea* outros produtos contendo sais mercuriais.

Comunique ao seu Médico ou Farmacêutico qualquer efeito adverso observado com a utilização deste produto.

Conservar a temperatura inferior a 25°C e ao abrigo da luz.

Verifique o prazo de validade inscrito na embalagem.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Medicamento não sujeito a receita médica.

FABRICADO E COMERCIALIZADO POR:

PARACÉLSIA – Indústria Farmacêutica, SA

Rua Antero de Quental, 639

4200-068 Porto

NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (INFARMED):

3407392 – *ECTODINE, solução cutânea* frasco de 125 ml.

DATA DA REVISÃO DO TEXTO:

12 de Agosto de 2005.

FOLHETO INFORMATIVO / ROTULAGEM

*Este rótulo contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar
ECTODINE, solução cutânea com precaução para obter os devidos efeitos.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.*

ECTODINE, Solução cutânea

USO EXTERNO

Solução anti-séptica, bactericida e fungicida

Frasco de 500 ml

COMPOSIÇÃO: Iodopovidona 100 mg/ml.

Excipientes: Tensioactivo aniónico, ácido cítrico (E-330), fosfato disódico e água purificada.

FORMA FARMACÊUTICA: solução cutânea.

CLASSIFICAÇÃO ATC: D08AG02

CATEGORIA FÁRMACO-TERAPÊUTICA:

Grupo XIV-1: Anti-infecciosos de aplicação tópica na pele

XIV-1-e: Anti-sépticos

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS, POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:

Dermatites microbianas (furúnculos e antrazes, foliculites, piodermites e acne papulopustuloso) e micóticas (pé de atleta, intertigo genital, prurido anal e vulvar).

Desinfecção da pele, das mucosas (antes de intervenções cirúrgicas, injeções e punções), e de feridas

Modo de usar: Aplicar localmente **ECTODINE, solução cutânea** pura, tantas vezes quanto necessário.

Desinfecção de queimaduras do 1º, 2º e 3º graus.

Modo de usar: Utilizar **ECTODINE, solução cutânea** sem diluição no penso de queimaduras ou diluída a 1/4 na lavagem das mesmas.

Lavagens do couro cabeludo

Modo de usar: Deitar cerca de 30 gotas de **ECTODINE, solução cutânea** em 1/2 litro de água.

Lavagens peritoneais

Modo de usar: Utilizar **ECTODINE, solução cutânea** diluída a 1/10 em soro fisiológico.

CONTRA-INDICAÇÕES: *ECTODINE, solução cutânea* não deve ser utilizada em indivíduos com hipersensibilidade ao iodo, durante a gravidez e em recém-nascidos com menos de 30 dias.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: A aplicação repetida de *ECTODINE, solução cutânea* em grandes superfícies cutâneas ou em zonas com pele lesada, pode provocar uma excessiva absorção de iodo.

INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS: Não utilizar ao mesmo tempo que *ECTODINE, solução cutânea* outros produtos contendo sais mercuriais.

Comunique ao seu Médico ou Farmacêutico qualquer efeito adverso observado com a utilização deste produto.

Conservar a temperatura inferior a 25°C e ao abrigo da luz.

Verifique o prazo de validade inscrito na embalagem.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Medicamento não sujeito a receita médica.

FABRICADO E COMERCIALIZADO POR:

PARACÉLSIA – Indústria Farmacêutica, SA

Rua Antero de Quental, 639

4200-068 Porto

NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (INFARMED):

3407491 – *ECTODINE, solução cutânea* frasco de 500 ml.

DATA DA REVISÃO DO TEXTO:

12 de Agosto de 2005.